

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIÈGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT,  
HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE) (Tél. 86-31-55 et 86-32-55)  
PROTECTION DES VEGETAUX - Rue St-Jean prolongée  
B. P. n° 20 31 - BALMA

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hte-Gne  
Rue St-Jean prolongée - BALMA  
C. C. P. 8612-11 TOULOUSE

- Supplément n° 3 au bulletin n° 91 -

1968 - 8

### Avertissements

#### ARBRES FRUITIERS

##### Tavelures du poirier et du pommier

Les projections d'ascospores se poursuivent encore nombreuses, alors que des taches sont apparues à partir du 21, puis du 27 avril.

En raison du temps incertain, il est nécessaire de renouveler la protection.

### Informations

##### Araignées rouges (P. ulmi)

Les éclosions d'oeufs d'hiver se terminent un peu partout. Dans les vergers très contaminés, il y a intérêt à effectuer une seconde application, alors que dans les vergers atteints moins gravement, le traitement devrait être placé dès à présent.

Dans tous les cas, nous recommandons de soigner particulièrement la pulvérisation.

##### Gnomonia du cerisier

Les risques d'infection persistant, appliquer un nouveau traitement.

##### Lyda du pêcher

Dans les vergers où la présence de cet insecte est constatée, attendre l'éclosion des larves pour traiter avec l'un des produits suivants : D. D. T., Parathion, Azinphos.

##### Oïdium du pommier

Dans les vergers sensibles, continuer à assurer la protection et supprimer par la taille, dans la mesure du possible, les jeunes pousses entièrement atteintes.

#### VIGNE

##### Oïdium

Appliquer à partir de maintenant et par journée chaude un premier traitement, de préférence par poudrage, dans les vignes habituellement très sensibles à ce champignon.

P. 150

CULTURES LEGUMIERES

Fraisier - Pourriture grise (Botrytis)

Les conditions climatiques et végétatives actuelles sont favorables à l'établissement des foyers. Il est donc recommandé d'appliquer sans attendre un nouveau traitement qui sera renouvelé 6 à 7 jours plus tard si le temps demeure pluvieux et doux.

PROTECTION DES ABEILLES

Nous rappelons à nouveau les recommandations contenues dans le bulletin n° 91 du 1er avril 1968.

BALMA, le 29 avril 1968

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles,

J. BESSON - E. JOLY

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux,

L. IMBERT

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de "MIDI-PYRENEES"

Le Directeur-Gérant : L. BOUYX